

# QUE FAIRE EN CAS DE SIGNES D'ALERTE ?

(hors infection génito-urinaire)

**Contactez au plus vite  
votre médecin traitant et votre cardiologue  
et réalisez le bilan sanguin suivant :**

- Ionogramme sanguin
- Bilan rénal
- Cétonémie



**Pour toute consultation, pensez à apporter votre ordonnance et/ou vos boîtes de médicaments.**

# JE SUIS INSUFFISANT CARDIAQUE

**NOM :**  
**PRENOM :**

**DATE DE NAISSANCE :**

 **CÔTE BASQUE  
CARDIOLOGIE**  
insuffisance.cardiaque@cardiologie64.fr

**Mon médecin traitant :**

Dr \_\_\_\_\_



**Mon cardiologue :**

Dr \_\_\_\_\_



*Pour toute consultation, pensez à apporter votre ordonnance et/ou vos boîtes de médicaments.*

# MES TRAITEMENTS

BETABLOQUANT : \_\_\_\_\_

IEC / ARA II / ARNi : \_\_\_\_\_

iSGLT2 : \_\_\_\_\_

ANTIALDOSTERONE : \_\_\_\_\_

DIURETIQUE : \_\_\_\_\_

**Contre indication aux traitements néphrotoxiques :**

AINS, Bactrim, Aminoside, injection d'iode...

**VALEURS DE REFERENCE**

**Poids :**

**Créatininémie :**

**Clairance :**

**NTproBNP /BNP :**



# REGLES DE BONNE UTILISATION DE CES MEDICAMENTS

## • Situations à risque :

- Intervention chirurgicale
- injection d'iode (scanner, coronarographie...)
- infection grave
- gastro-entérite
- déshydratation sévère
- canicule,
- jeûne prolongé
- consommation excessive d'alcool



## • Signes d'alerte :

- Fièvre
- Nausées/vomissements
- Diarrhées et/ou douleurs abdominales
- Fatigue anormale
- Malaise
- Infection génito-urinaire

*Dans ces situations, demander avis médical afin de suspendre les traitements nécessaires.*